

TWO NEW GENERA  
OF PLANTS  
FROM NEPAL

DR. N. WALLICH

1822

---

XXVIII. *Description of two new Genera of Plants from Nepal.*  
*By Nathaniel Wallich, M.D. F.L.S. &c.*

*Read March 19, 1822.*

COLQUHOUNIA.

SYST. ARTIF. *Didynamia Gymnospermia.*

ORDO NATURAL. *Labiatae.*

CHAR. GEN. *Calyx cylindricus, fauce æquali 5-dentatâ: fructifer clausus. Corolla bilabiata; labium superius fornicateum, bidentatum; inferius trilobum lobis lateralibus fauci ampliatæ utrinque insertis, intermedio minore integro. Stamina adscendentia; antherarum lobi divaricati nudi. Stigma bilobum, lobo superiore breviore. Ovula solitaria, pendula! Achenia maxima alata. Perispermum copiosum. Embryo erectus!*

HABITUS. *Frutex latè volubilis supernè tomento farinoso stellato ferrugineo: rami juniores alternatim compressi, subarticulati. Folia ovalia, serrata, scabriuscula, odore debili aromatico. Flores speciosi, coccinei, fasciculati, axillares, subverticillati, nunc subracemosi.*

Dixi in honorem amici æstumatissimi Roberti Colquhoun, Equitis Baroneti, historiæ naturalis fautoris indefessi, qui horum botanicum Calcuttæ ditavit plurimis plantis viventibus seminibus, speciminibus nec non observationibus phytographiam regionis *Kumaon* spectantibus.

COLQUHOUNIA

COLQUHOUNIA COCCINEA, Wall.

Legi in variis montibus Nepaliæ, Chesapang, Chandaghiry, Sheopare; etiam in sylvis minus elevatis Suembonath, Gokurna, &c. Floret sub fine pluviarum et tempore frigoris, ab Octobre ad Februarium. Fructus maturescunt Martio.

Nomen Parbutteum *Aesinallæ*; Newarrense *Goontomah*.

*Frutex* amplius super alios, arboresque minores volubilis. *Rami* longissimi, orgyales, obsoletè tetragoni, pennam cygneam ad digitum crassi, a punctis minutis copiosis scabriuscui, tomento parco hinc inde conspersi, dilutè ferruginei; juniores gracillimi, obsoletè 4-angulares, sulcis duobus oppositis notati, ad insertionem foliorum alternatim dilatato-complanati lineâque elevatâ annulari subarticulati, vestiti tomento denso ferrugineo lepidoso stellato ciliato friabili. *Folia* opposita, ovata, acuminata, 3—5-pollicaria, vetusta, duplo majora, patentia, obtusè crenulata, basi acutâ integriora, utrinque a tomento parco asperula, suprà atro-viridia, rugosa, opaca, subtùs pallida costâ nervisque suboppositis arcuatis prominentibus tomentosis venisque transversim reticulatis; *novella* densissimè tomentosa incana. *Petioli* unguiculares, semiteretes, tomentosi, suprà plani. *Flores* magni, inodori, fasciculati, plerumque ternati, axillares, subverticillati; *verticilli* nunc brevissimè pedunculati, saepiùs ferè sessiles, in ramulis junioribus approximati subbracemosi. *Pedunculi* teretes, patentes, petiolo triplo breviores, tomentosi, basi, nunc medio quoque, bracteolis duabus oppositis linearibus persistentibus. *Calyx* basi subcylindricus, sursum ampliatus et subcampanulatus, membranaceus, scariosus, persistens, semuncialis, tomentosus, intùs lèvis, nitidus, obsoletè 5-nervius et reticulatus, leviter incurvus, dorso

dorso parum convexior, limbo 5-dentato patentiusculo dentibus triangulari-ovatis acutis 1-nerviis post florescentiam clausis et subvalvatis. *Corolla* coccinea, calyce duplo longior, villis canis mollibus brevibus hyalinis articulatis extus obsita; *tubus* brevis inclusus, cylindricus, mox amplatus in *faucem* amplam lateribus leviter compressam, subtus foveolatam perviam nudam. *Limbus* 2-labiatus; *labium superius* adscendens, ovatum, apice bidentatum, dentibus lanceolatis obtusiusculis, fornicatum, basi dorsi leviter contractum et impressum; *inferius* majus, patens, tripartitum, lobis integerrimis obtusis, lateralibus obliquè ovatis leviter recurvis fauci utrinque insertis et quasi interlabialibus: intermedio duplo ferè illis breviore descendente concaviusculo linguæ formi citius emarcescente. *Stamina* quatuor absque rudimento quinti, intra galeam adscendentia, haud planè ab illâ recondita sinibus (ut dudum monuit cel. R. Brown in *Prodr. Fl. Nov. Holl.* i. p. 500.) interlabialibus primariisque labii inferioris intra faucem inserta. *Filamenta* crassiuscula, linearia, villosula, colorata, apice parum dilatata et incurva; superiora duo breviora. *Antheræ* parvæ, oblongæ, nutantes, purpurascentes: lobis divaricatis (sursum et deorsum) nudis obtusis rimâ continuâ longitudinali et quasi communi dehiscentibus, polline flavo majusculo. *Ovaria* quatuor, oblonga, planiuscula, apice parum obliqua et crenulata, disco imposita *hypogyno* annulari angusto obsoletè quadrilobo flavicante centro parum elevatiore subconico, uniloculari, monospora: *ovulum* teres ex apice placentulæ erectæ fungosæ *pendulum!* *Stylus* filiformis, lævis, purpurascens, longitudine staminum cumque illis adscendens. *Stigma* bilobum, lobis subulatis acutis patulis, superiore dimidio breviore. *Achenia* quatuor, rarius unum duove cassa, grandia, calyce persistente haud aucto dentibus

dentibus conniventibus subvalvatis clauso parum breviora, ejus fundo supra discum hypogynum ferè immutatum inserta, erecta, glabra, exsucca, basi ovalia conniventia convexiuscula intùs obtusè carinata subtrigona, apice terminata alà membranaceâ parum recurvâ oblonga apice hinc convexâ inde acutâ levissimeque crenulatâ margine altero recto subsulcato crassiore altero (exteriore) convexo scindente, epidermide obducta tenuissimâ fuscescenti; 1-locularia 1-sperma, indehiscentia. *Semen* obovatum compresiusculum, obtusum, basi acutiusculum, album, læve, infra apicem suspensum funiculo longiusculo descendente et supra basin placentæ parvæ fungosæ erectæ liberæ inserto. *Integumentum simplex*, tenuissimum. *Perispermum* crassiusculum, carnosum, album, embryonem arctè involvens eique conforme. *Embryo* ovatus, planus, erectus. *Cotyledones* maximæ, ovatæ, obtusæ, basi subcordatæ. *Plumula* inconspicua. *Radicula* conica, acuta, brevis, infera.

**OBS.** Genus pulcherrimum *Leucadi*, Burm. (R. Brown *l. cit.* 504.) et *Dracocephalo* quodammodo affine ab utroque et tota ferè familia diversum fructus magnitudine et forma, positione ovuli penduli seminisque suspensi et perispermo copioso. Odor foliorum partiumque novellarum citrinus, debilis.

### HEMIPHRAGMA, Wall.

**SYST. ARTIF.** *Tetrandria monogynia* floribus monopetalis monocarpis inferis. An potius *Didynamia angiospermia*?

**ORD. NATURAL.** *Scrophularinæ*, Brown Prodr. Nov. Holl. i. 433.

**CHAR. GEN.** *Calyx* 5-partitus. *Corolla* infundibuliformis limbo patente 5-fido subæquali. *Stamina* 4, æqualia, antheris nudis liberis. *Stigma* simplex, acutum. *Bacca* globosa exsucca

succa incompletè 2-locularis, polysperma, dissepimento placentifero sursum fisso.

*Habitus.* *Herba* gracilis, repens, pilosula. *Folia* duplicitis indolis; *caulina* et *ramea* orbiculato-reniformia, opposita, subsessilia, dentata: alia acerosa, conferta in fasciculos petiolatos, gracillima. *Flores* solitarii, parvi, rosei, brevè pedicellati, ebracteati, axillares foliorum majorum alterni vel oppositi, vel terminales ramulorum novellorum. *Baccæ* globosæ, ruberrimæ, nitidæ.

### HEMIPHRAGMA HETEROPHYLLUM, Wall.

Planta sat communis in montibus Nepaliæ saxatilis florens et fructifera toto ferè anno, præcipue ab Octobre ad Februarium.

*Caulis* gracillimus, pedalis bipedalisque, prostratus, et per distantiam pollicum 3 vel 4 radicans, radiculis simplicibus pallidis fibrilosis, obsoletè quadrangularis, epidermide fuscescente secedente. *Rami* pauci versus extremitatem caulis, tenerrimi, indivisi, breves, oppositi, acutanguli, asperuli a pilis brevibus articulatis patentibus hyalinis. *Folia* difformia. *Caulina* ovato-cordata subreniformia plana, patentia, membranacea, citius emarcescentia, opposita et ferè amplexicaulia, brevissimè petiolata, unguicularia ad pollicaria, remota, interdum pollices plures distantia, obtusa, acutiusculè et lato-dentata, lobis baseos integris rotundatis, utrinque pilosula, subtùs trinervia leviterque reticulato-venosa, siccitate ferruginea; superiora et *ramea* ovata vel suborbiculata, pauca, bracteiformia, ter quaterve minor. *Folia* alia subulato-acerosa, 2—3-linearia semiteretia, suprà sulcata, pilosula, acuta, lætè viridia, nitida, sessilia, undique patentia, 20—30 circiter conferta in fasciculos ovatos unguiculares

culares breve petiolatos patentes, axillares foliorum caulinorum oppositos vel terminales. *Petioli* foliorum majorum vix 2-lineares, suprà sulcati, pilosuli, basi lineolâ tenuissimâ caulem vel ramum ambientes. *Stipulae* nullæ. *Flores* parvi, solitarii, axillares, vel centrales in fasciculis *pedicello* insidentes brevissimo villoso ebracteato. *Calyx* sub-ovatus, persistens, densè villosus, profundè 5-partitus, *lacinias* patentiusculis linearibus purpureo-acutis. *Corolla* rosea, calyce duplo major, infundibuliformis, glabra; *tubus* obsoletè 4-gonus medio ventricosus, florescens; *limbus* patens, 5- (raro 6-) fidus, valde obscure 2-labiatus, æstivatione imbricatus, laciniis ovalibus obtusis nunc parum retusis, duabus superioribus parum latioribus; *faux* pervia, nuda. *Stamina* quatuor æqualia parum supra saucem elevata medio tubi inserta, antheris ovatis erectis parum conniventibus utrinque longitudinaliter dehiscentibus nudis. *Pistillum* staminibus parum brevius; *ovarium* subrotundum, læve; *disco hypogyno* exiguo annulari flavicante suffultum, biloculare, polysporum, ovulis placentæ dissepimento apice minutum perforato utrinque adnatæ insertis; *stylus* teres brevis; *stigma* leviter incrassatum, simplex, acutum. *Bacca* ovato-globosa, magnitudine pisi, stylo persistente coronata, suffulta calyce patentissimo haud aucta, coccinea, lævissima, nitida, inscripta lineis gracillimis impressis quatuor e vertice cruciatim decurrentibus, commissuras valvarum mentientibus, cultro difficilius in totidem valvulas partilibus, nunquam sponte dehiscens; *membrana exterior* tenuissima, chartacea: *caro* spongiosa, pallida, basi copiosior vertice tenuior. *Dissepimentum* incompletum, membranaceum, tenuissimum, vertice perforatum hiatu inversè triangulari ætate ultra medium baccæ deorsum extenso. *Placentæ* duæ semi-lunato-bicornes spongiosæ, convexæ, hiatui dissepimenti utrinque

utrinque adnatae, ibique confluentes, medio crassiores, sursum attenuatae, rugosulæ. *Semina* numerosa, minuta, pallide ferruginea, ovata, sessilia, punctata, mox soluta fundumque baccæ utrinque occupantia. *Integumentum* simplex. *Perispermum* carnosum, aqueo-pallidum, tenue, semine conforme. *Embryo* dicotyledoneus. *Radicula* centripeta.

Obs. Plantula elegantissima *Scrophularin*is potius quam *Gentianæ* Juss. adsocianda, ab his discrepans corolla staminibusque, ab illis quodammodo abludens structurâ fructûs. An *Solanearum* civis? Nomen imposui a septo incompleto quasi dimidiato.

